

## Instrucciones para las trampas adhesivas para insectos

- 1) Las trampas adhesivas amarillas pueden ser adquiridas de diferentes proveedores, por lo que el ensamblaje de la trampa variará según las trampas que se compren.
- 2) Las trampas deberán colocarse dentro del dosel de las palmeras, adheridas al pecíolo.



- 3) Las trampas deben recolectarse todas las semanas para obtener resultados óptimos, con un máximo de 2 semanas.
- 4) Después de coleccionar la trampa adhesiva, posicónela de manera horizontal y cúbrala con una envoltura de plástico (el plástico genérico que se compra en los supermercados para cubrir los alimentos funciona bien) y replácela con una nueva trampa.



- 5) Las trampas adhesivas deberán enviarse mediante envío del día siguiente a esta dirección:

- a. 3205 College Ave. Davie, FL 33314
- b. Atención: Brian Bahder

6) El procesamiento de las muestras implicará un recuento de individuos de *Haplaxius crudus* (el vector del bronceado letal) a \$15 por trampa. En el formulario de envío, usted puede seleccionar que automáticamente se analicen individualmente todos los especímenes para detectar fitoplasma a \$10 por insecto o el análisis de múltiples *Haplaxius crudus* al mismo tiempo por \$75 (se utilizan 10 insectos por reacción). Alternativamente, usted puede solicitar seguimiento del monitoreo, en donde trabajo con usted para determinar el mejor enfoque para corroborar los números que se encuentran en sus trampas.

7) Una vez que se desarrolle una estrategia de muestreo, se generará una factura y los cheques deberán hacerse a nombre de la "University of Florida" y enviarse por correo a la dirección antes mencionada.